

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE	LITHOLOGIE ET SOLS	TYPES D'AGRICULTURE	POPULATION				EVOLUTION PREVISIBLE - DYNAMISME DE LA ZONE						
			DENSITE POPULATION	AGRICULTURE ACTIVE TOTALE	DOUBLE ACTIVITE	AGE							
vallées affluentes du Rhône	lithosols sur granite	12 vignobles d'excellente qualité. Appellation contrôlée. (Hermitage, Crozes, St.Joseph), cultivés en terrasses.	-5h/km2	20-40%	20-10%	âgée	vignobles d'appellation contrôlée	Bonne rentabilité. Unité de la zone due à un petit nombre de propriétaires, bien que le mode d'exploitation reste archaïque.					
		13 vignobles. Sommet de coteaux Piedmont ardéchois V.D.Q.S., A.O.S.						Communications mauvaises. Problème de l'eau. Proximité de la vallée du Rhône attirant les jeunes.					
coteaux longeant le Rhône, partie aval du Doux		14 vignes et vergers (abricotiers, pêcheurs) } en voie d'abandon ou abandonnées	-20h/km2					20-40%	20-10%	âgée	vignobles d'appellation contrôlée	Zones envahies par la lande à Genévrier oxycèdre et Chêne vert. Terrasses existantes dans le cas d'une conjoncture économique favorable, reprise de la viticulture avec des moyens modernes, coopérative dynamique. Zone touristique mais problème de l'eau pour résidences secondaires.	
		15 vignes en terrasses.										Situation périlleuse sur le plan démographique. Exode importante vers la vallée du Rhône. Double activité agricole possible mais éloignement dû au relief. Agriculture: petites parcelles, vergers en mauvais état (problème d'écoulement, les décalages de maturation ne sont plus utilisables).	
pentes granitiques du Massif Central		lithosols sur granite	16 polyculture: céréales, cultures fourragères, élevage (moutons, chèvres, quelques vaches), vergers (abricotiers, pêcheurs, cerisiers). Rendements médiocres.					20-40h/km2	Ardèche 80-60% Drôme 40-60%	20-10%	âgée+jeune	vignobles d'appellation contrôlée	Anciennes cultures souvent envahies par la lande. Principales causes: éloignement, communications difficiles, problèmes d'eau et d'électricité.
extrémité découpée du plateau			17 polyculture en voie d'abandon (pelouses xérophiles).					-20h/km2					80%
Ouest du plateau ardéchois		sols bruns acides à sols bruns faiblement lessivés sablo-limoneux sur roches métamorphiques	18 surface toujours en herbe importante dans les dépressions. Cultures fourragères et élevage bovin (laitier).					40-70h/km2	60-80%	20-30%	âgée+jeune	vignobles d'appellation contrôlée	Mêmes problèmes d'exode et d'éloignement (dus au découpage du relief) que la zone précédente. Vergers "problématiques" (décalage de maturation nécessaire pour l'écoulement des pêches compensé par l'introduction de variétés tardives dans la plaine). Vergers souvent en mauvais état. Techniques culturales moins élaborées. Le travail dans la vallée du Rhône permet le maintien des populations sur des terres souvent ingrates.
	19 même type d'agriculture, moins dynamique: problèmes de population (départ, vieillissement, éloignement).		20-40h/km2	20-10%	âgée								
bordure orientale du plateau ardéchois. Zone avec influence méridionale	sols bruns faiblement dessaturés à sols bruns acides	20 polyculture du même type que précédemment mais proximité de la vallée du Rhône: installation des vergers.	30-70h/km2	60-80%	≠ 30%	âgée+jeune	vignobles d'appellation contrôlée	Abandon des terrasses. Peu d'espoir de reprise. Problème d'érosion.					
		21 même type mais problèmes démographiques plus accentués (éloignement, problème de l'eau: abandon).	20-40h/km2						jeune+adulte	Zone "riche" depuis l'installation des vergers (arrosage). Vigne en extension actuelle, zone où elle devrait prévaloir si bon écoulement des récoltes possible (coopérative) et si la crise des fruits continue (gels successifs). Future zone d'extension des aires suburbaines Tain - Valence (Romans).			
pentes des vallées intérieures au massif	lithosols sur granite et gneiss	22 vigne abandonnée sur terrasses (consommation familiale) éloignement, manque de main d'oeuvre. Recolonisation par les landes à Sarothamnus scoparius.	-20h/km2	60-80%	20-30%	âgée	vignobles d'appellation contrôlée	Zone de population plus âgée par rapport au reste de la plaine. Agriculture "riche": irrigation, communication facile. Proximité de la ville: fixe la population. Vocation agricole plus durable que pour la zone précédente (position géographique).					
		plaine de l'Isère	sols rouges des terrasses (fersiallitiques) à réserves calcaïques très caillouteux						24 vignes (appellation contrôlée) et vergers (agriculture dynamique). A - zone moins gélive B - zone plus gélive	40-70h/km2	60-40%	20-30%	jeune+adulte
25 céréaliculture (blé, maïs, sorgho) colza. arboriculture: 1- pêcheurs 2- poiriers, pommiers. viticulture: A- appellation contrôlée, B- non appellation	60-80%			20-30%	adulte	Grande céréaliculture sur limons. Bons rendements, moins "problématique" que les vergers. Type d'agriculture dû à l'ancienneté de l'occupation des terres.							
26 polyculture: céréales (blé, maïs, sorgho), cultures fourragères. Bons rendements							40-70h/km2	60-80%	20-10%				
rebord nord de la plaine	sol brun calcaire de texture moyenne sur limons	quand l'irrigation est possible, cultures légumières de plein champ.		20-10%	adulte	Richesse des vergers d'abricotiers (microclimat et sol favorables). Proximité de Tain - Tournon, communications faciles, possibilité de travail: maintien des populations avec double activité. Région dynamique. Zone résidentielle de Tain. Maintien du type d'agriculture existant.							
plaine Bren-les-Bouchères	sols bruns modaux	27 vergers: zone de prédilection de l'abricotier (microclimat favorable). Bons rendements.		≠ 50%	20-30%	adulte	Même type d'agriculture que Larnage (microclimat favorable aux abricotiers) mais communications plus difficiles (relief). Population plus âgée. Exode vers Tain et Tournon. Petite polyculture peu rentable à côté de l'arboriculture.						
plateau de Larnage	sols bruns calcaires profonds et limoneux	28 vergers (abricotiers, pêcheurs), élevage (quelques vaches), céréales (blé, maïs), cultures fourragères. rendements moyens.		60-80%	20-10%	jeune	Communications faciles. Habitat lâche. Vocation agricole. La présence de l'irrigation facilite l'agriculture: vergers, légumes. Encadrement dynamique retenant bien les jeunes sur les terres et expliquant ici la présence des vergers (coopérative de St.Donat).						
collines au Nord de Mercuriol	sols bruns calcaires profonds et limoneux	29 vergers (pêcheurs), vigne (n'appartenant plus à la zone d'appellation), céréales, quelques cultures maraîchères de plein champ.		60-80%	20-10%	âgée+jeune	Mêmes causes que précédemment pour la présence des vignes, plus exposition favorable (Chêne vert) et sol molassique. Piedmont des collines drômoises en bordure de la plaine de l'Isère: zone résidentielle (Mercuriol, Chanos).						
plaine de Marsaz, rebord de l'Herbasse au Sud de Margès	sols bruns calcaires sols bruns modaux	30 vigne (rendements moyens) n'appartenant plus à la zone d'appellation, quelques pelouses sèches.	100-70h/km2	40-60%	20-30%	âgée	Communications difficiles (relief). Population âgée. Exode rural important. Agriculture de subsistance. Exposition plus favorable que pour la zone suivante: quelques vergers.						
coteaux exposition S-SE	sols bruns modaux sols bruns calcaires régosols sur molasse	31 polyculture (rendements très moyens): céréales, quelques vaches, cultures fourragères.	20-40h/km2	60-80%	20-10%	âgée	Zone vidée par l'exode rural (isolement, communications difficiles, agriculture peu rentable). Zone la plus "problématique" de la carte de la région drômoise.						
collines exposition Sud	sols bruns sols bruns lessivés	32 polyculture (rendements très moyens): céréales, quelques vaches, tabac, cultures fourragères.	20-40h/km2	60-80%	20-10%	âgée	Grandes surfaces cultivées sur le plateau, réseau de communication lâche mais facile. Bilan positif pour l'agriculture, mais difficultés dues au sol. Menace d'exode rural: l'activité secondaire pouvant être remise en question (licenciements à l'usine de Clérieux).						
collines drômoises N-NE	sols bruns	33 céréales: 50% surface communale, cultures fourragères: 10 - 20% surface communale. Elevage bovin moyen.	40-70h/km2	≠ 50%	20-30%	âgée	Même type d'agriculture, avec toujours le handicap du sol et relief plus défavorable que précédemment. Exode rural plus prononcé.						
plateau de St.Bardoux Sud-Est de l'Herbasse	sols bruns lessivés à marmorisation de profondeur (nappe peu profonde)	34 même type d'agriculture mais rendements plus médiocres: handicap du sol et du relief.	20-40h/km2	60-80%	20-10%	âgée	Petites exploitations où toutes les parcelles sont utiles pour maintenir un équilibre précaire. Or, zone d'établissement de routes, barrages..., beaucoup de propriétaires ainsi expropriés ont abandonné l'agriculture. Double activité très largement répandue. Vallée du Rhône: essentiellement voie de passage.						
plateau de St.Bardoux partie Sud plus vallonnée	sols fortement dessaturés caillouteux	35 petites parcelles de vergers (pommiers, poiriers, cerisiers) cultures maraîchères (jardinage).	70-100h/km2 et plus	40-60%	30-50%	âgée+jeune	Vocation agricole. Dynamisme de cette zone "riche" à remarquer, avec population agricole assez jeune. Possibilités de double activité agricole: Tain l'Hermitage, Clérieux proches et facilement accessibles, ou Valence (Roche de Glun, Pont de l'Isère).						
vallée du Rhône	sols alluviaux jeunes	36 maïs, blé, cultures fourragères. Bons rendements, grandes parcelles. Quelques vergers (pommiers et poiriers) et cultures maraîchères de plein champ. Populiculture.	40-70h/km2	≠ 60%	≠ 20%	âgée	Vocation agricole. Risques de départs: isolement, exigüité des terres. Souvent, seulement couloir de passage.						
Herbasse, les Bouchères-Bren bordure de l'Isère	sols alluviaux	37 même type de polyculture que précédemment mais zone plus existante. Vergers absents.	20-40h/km2	60-80%	20-10%	âgée	Zone de tourisme passager. Saison estivale: baignade, pêche...						
plaine de Veauves	sols alluviaux	23 sans agriculture (crues violentes, vallée étroites).	-20h/km2	80%	20-10%	âgée	Populiculture à développer. Agriculture non rentable: acharnement de personnes âgées traditionalistes.						
dépansions, petites vallées	alluvions récentes	38 cultures maraîchères, maïs: handicap du sol.	20-40h/km2	80%	20-30%	jeune	Vocation agricole, entretien des canaux de drainage des sols à développer et maintenir. Populiculture possible. Zone retenant bien la population: possibilité de double activité agricole.						
fonds des vallées ardéchoises	sol de texture lourde à pseudo-gley de profondeur	39 cultures maraîchères de plein champ, blé et maïs, élevage intensif de bovins. Agriculture dynamique.	40-70h/km2	60-80%	20-30%	jeune							
amont de la vallée de la Bouterne	sol de texture lourde à pseudo-gley de profondeur												
Veauves	sols alluviaux récents texture légères (hydromor.)												

PRESSION URBAINE

41 Zone urbaine

42 Zone périurbaine

43 Prévision de développement des zones périurbaines

44 Zone de loisirs (pêche, baignade)

40 Remblai de barrage