TABLEAU XI

Amplitude écologique des principales espèces de la basse vallée de l'Isère.

Nappe phréatique : profondeur croissante et amplitude de variation croissante jusqu'à 1 m (valeurs moyennes estivales) — Amplitude supérieure à 1 m

Profondeur moyenne : très faible : 0 à 0,30 m ; faible : 0,20 à 0,70 m ; moyenne : 0,60 à 1,60 m ; forte : 1 à 2,40 m ; très forte : > 2,20 m ; variable : < 2 m

NAPPE — Eau permanente

Amplitude de variation : très faible : 0,10 à 0,30 m ; faible : 0,20 à 0,40 m ; moyenne : 0,20 à 0,60 m ; forte : 0,80 à 1 m ; très forte : > 1 m



Groupts aquatiques	Roselière	Lande à Aune	Aunaie typique	Aunaie à Crataegus	Aunaie à Frêne	Frênaie	Frênaie à Chêne	Frênaie à Robinier	Bois de Saules et Peupliers	Taillis de Saules	Groupements pionniers Sables	Galets
			Alnetum glutinoso-incanae (Bois tendres)				Fraxino-Ulmetum (Bois durs)		Salici-Populetum (Bois tendres)			

Espèces caractérisant les divers groupements et faciès

+° Arbre +° Arbuste + Espèce herbacée